

Judo

- › Insetticida piretroide in sospensione di capsule
- › Attivo per contatto e secondariamente per ingestione
- › Ampio spettro d'azione, attività abbattente ed adeguata persistenza

COMPOSIZIONE

lambda cialotrina 9,4% (100 g/l)

FORMULAZIONE

sospensione di capsule (CS)

CODICE IRAC

3A

REG. MIN. SALUTE

n° 13486 del 21.11.2011

BUFFER ZONE

Consultare l'etichetta

INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: H302; H410; EUH401



Attenzione



SETTORI DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dose	Note	Phi	Max
Vite (da vino)	Tignola e tignoletta	25-30 ml/hl (250-300 ml/ha)		21 gg	1
	Cicaline	15-25 ml/hl (150-250 ml/ha)			
Vite (da tavola)	Cicaline	15 ml/hl (150 ml/ha)			1
Drupacee (Pesco, Nettarino)	Afidi	10-15 ml/hl (100-150 ml/ha)	Trattare con foglie non accartocciate		1
	Mosca della frutta	15-17,5 ml/hl (150-175 ml/ha)	Intervallo tra i trattamenti 14 gg		2
Drupacee (Albicocco)	Afidi, Mosca della frutta	15-25 ml/hl (150-250 ml/ha)	Trattare con foglie non accartocciate		1
Pomacee (Melo, Pero)	Afidi		Trattare con foglie non accartocciate	7 gg	1
	Carpocapsa	15 ml/hl (150 ml/ha)	Intervallo tra i trattamenti 14 gg		2
	Psilla del pero				2
Nocciolo	Balanino	20-25 ml/hl (200-250 ml/ha)			1
Brassicaceae (cavolfiore, cavolo broccolo)	Lepidotteri	15-20 ml/hl (150-200 ml/ha)			1
	Afidi	10-15 ml/hl (100-150 ml/ha)			1
	Nottue defogliatrici	10-12,5 ml/hl (100-125 ml/ha)			1

Coltura	Avversità	Dose	Note	Phi	Max
Mais	Piralidi	20-25 ml/hl (200-250 ml/ha)		28 gg	1
	Afidi	15-20 ml/hl (150-200 ml/ha)			1
	Nottue	10-12,5 ml/hl (100-125 ml/ha)			1
Pomodoro (pieno campo)	Lepidotteri	15-20 ml/hl (150-200 ml/ha)	Intervallo tra i trattamenti 14 gg	3 gg	2
	Afidi	10-15 ml/hl (100-150 ml/ha)			2
	Nottue defogliatrici	10-12,5 ml/hl (100-125 ml/ha)			2
Zucchino	Afidi	10-15 ml/hl (100-150 ml/ha)		3 gg	1
Patata	Dorifora	15-20 ml/hl (150-200 ml/ha)	Intervallo tra i trattamenti 14 gg	15 gg	2
	Nottue defogliatrici	10-12,5 ml/hl (100-125 ml/ha)			1
Cereali (Avena, Frumento, Orzo)	Afidi	15-20 ml/hl (150-200 ml/ha)		30 gg	1
Floreali e ornamentali	Afidi	10-15 ml/hl (100-150 ml/ha)		n.r.	1

Prodotto originale Ascenza



FLACONE
0,25 l (cartone 24 pz)

FLACONE
1 l (cartone 12 pz)

AVVERTENZE

Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante (Vector). Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Eliminare le infestanti prima della fioritura. Effettuare il trattamento nelle prime ore del mattino o nelle ore serali.