

# TREBON® UP

COMPOSIZIONE	<b>Etofenprox 30% (287,5 g/L)</b>
FORMULAZIONE	<b>Liquido emulsionabile</b>
GRUPPO	<b>IRAC 3A</b>
N. REGISTRAZIONE	<b>8735 del 23-03-1995</b>
CONFEZIONE	<b>0,5 L (x 10)</b>

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
<b>AGRUMI</b> (Arancio, Mandarino compreso Clementine ed altri ibridi, Limone, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Arancio amaro, Mapo, Tangelo)	Cicaline, ( <i>E. decedens</i> ), Cimicetta ( <i>C. trivialis</i> ), Mosca ( <i>C. capitata</i> )	50 ml/hL (600 - 750 ml/ha)  max 2 interventi/anno	7 gg
<b>MELO, PERO*</b>	Tignole ( <i>C. pomonella</i> , <i>C. molesta</i> ), Mosca ( <i>C. capitata</i> ), Cicaline ( <i>Empoasca spp.</i> ), Psille (adulti di <i>P. pyri</i> , <i>P. mali</i> , <i>C. melanoneura</i> , <i>C. costalis</i> ) <i>Halyomorpha halys</i>	50 ml/hL (500 - 750 ml/ha)  3 interventi di cui almeno 1 in pre-fioritura	7 gg
<b>DRUPACEE</b> (Pesco, Albicocco, Ciliegio e Nettare)	Tignole ( <i>C. molesta</i> , <i>A. lineatella</i> , <i>C. funebrana</i> , <i>A. orana</i> ecc), Cicaline ( <i>Empoasca spp.</i> , <i>Z. flammigera</i> , <i>C. viridis</i> ), Miridi ( <i>Calocoris spp.</i> , <i>Lygus spp.</i> , <i>A. lineolatus</i> ), Mosche ( <i>C. capitata</i> , <i>R. cerasi</i> ), Tripidi ( <i>T. major</i> , <i>T. meridionalis</i> , <i>T. tabaci</i> ), Tortrici ( <i>A. pulchellana</i> , <i>Archips spp.</i> ) <i>Halyomorpha halys</i>	50 ml/hL (500 - 750 ml/ha)	7 gg
		Pesco max 2 interventi/anno	
	Albicocco max 2 interventi/anno	10 gg	
<b>DRUPACEE</b> (Amarena)	Tignole ( <i>C. molesta</i> , <i>A. lineatella</i> , <i>C. funebrana</i> , <i>A. orana</i> ecc), Cicaline ( <i>Empoasca spp.</i> , <i>Z. flammigera</i> , <i>C. viridis</i> ), Miridi ( <i>Calocoris spp.</i> , <i>Lygus spp.</i> , <i>A. lineolatus</i> ), Mosche ( <i>C. capitata</i> , <i>R. cerasi</i> ), Tripidi ( <i>T. major</i> , <i>T. meridionalis</i> , <i>T. tabaci</i> ), Tortrici ( <i>A. pulchellana</i> , <i>Archips spp.</i> )	50 ml/hL (500 - 750 ml/ha)  max 1 intervento/anno	3 gg
		Ciliegio max 1 intervento/anno	3 gg

\* da non applicare sulle cultivar di Pero a buccia liscia ed in particolare su pere Williams, Max red bartlet (Williams rosse), Coscia, S.Maria, Morettini, Dr. Guyot.

**Insetticida polivalente ad elevato potere abbattente registrato su numerose colture**

## CARATTERISTICHE

TREBON UP è un insetticida polivalente, che agisce per contatto ed ingestione con un elevato potere abbattente. TREBON UP è autorizzato su un vastissimo numero di colture e di parassiti tra i quali la Cimice Asiatica. Per individuare il momento ideale degli interventi monitorare costantemente la presenza degli insetti con le soluzioni PHEROCON (p. 136).

## TUTELA DELL'AMBIENTE

Rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di: 20 metri per Lattuga e simili, Spinaci e simili, Aglio, Cipolla, Solanacee, Fagiolino, Mais, Patata, Barbabietola da zucchero, con dispositivi che riducano la deriva del 25%; 25 metri per vite, con dispositivi che riducano la deriva del 60%; 25 metri per Mela, Pera, Pesco, Albicocco, Frutta a guscio, Ciliegio, con dispositivi che riducano la deriva del 90%; 20 metri per Agrumi, Kiwi, Kaki, con dispositivi che riducano la deriva del 92%; 20 metri per Fico d'India, con dispositivi che riducano la deriva del 90%.

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
<b>NOCCIOLO</b>	Cimici ( <i>G. acuteangulatus</i> , <i>N. viridula</i> , <i>P. prasina</i> ), Balanino ( <i>C. nucum</i> ) <b><i>Halyomorpha halys</i></b>	50 ml/hL (500 - 750 ml/ha)  max 1 intervento/anno	14 gg
<b>CASTAGNO</b>	Balanino ( <i>C. elephas</i> ), Tignole ( <i>C. pomonella</i> , ecc), Cinipide ( <i>D. kuriphilus</i> )	50 ml/hL (500 - 750 ml/ha)  max 1 intervento/anno	21 gg
<b>ACTINIDIA</b>	Mosca ( <i>C. capitata</i> ), Eulia ( <i>A. pulchellana</i> ), Metcalfa ( <i>M. pruinosa</i> ), Miridi ( <i>Calocoris spp.</i> , <i>Lygus spp.</i> ) <b><i>Halyomorpha halys</i></b>	50 ml/hL (500 - 750 ml/ha)  max 2 interventi/anno	7 gg
<b>KAKI</b>	Mosca ( <i>C. capitata</i> ), Eulia ( <i>A. pulchellana</i> ), Metcalfa ( <i>M. pruinosa</i> ), Miridi ( <i>Calocoris spp.</i> , <i>Lygus spp.</i> )	50 ml/hL (500 - 750 ml/ha)  max 2 interventi/anno	7 gg
<b>VITE</b>	Cicadellidi ( <i>E. vitis</i> , <i>Z. rhamni</i> , <i>S. titanus</i> ), Tignole ( <i>L. botrana</i> , <i>E. ambiguella</i> ), Metcalfa ( <i>M. pruinosa</i> ), Tripidi	50 ml/hL (500 ml/ha)  max 2 interventi/anno	21 gg
<b>POMODORO</b> (pieno campo)	Tignole ( <i>T. absoluta</i> , ecc), Nottue ( <i>Spodoptera spp.</i> , <i>H. armigera</i> ), Miridi ( <i>Calocoris spp.</i> , <i>Lygus spp.</i> ), Cimici ( <i>N. viridula</i> , <i>P. prasina</i> ), Tripidi ed Aleurodidi	50 ml/hL (500 ml/ha)  max 1 intervento/anno	3 gg
<b>LATTUGHE E SIMILI</b> (Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola, Dolcetta)	Nottue, Miridi, Tripidi	50 ml/hL (500 ml/ha)  max 2 interventi/anno	7 gg
<b>SPINACI E SIMILI</b> (Spinaci, Bietola da costa, Bietola da foglia)	Nottue, Aliche ( <i>Phyllotreta spp.</i> ), Cleono, Miridi	50 ml/hL (500 ml/ha)  max 2 interventi/anno	7 gg
<b>BARBABIETOLA DA ZUCCHERO</b> * Le foglie di Barbabietola trattate NON devono essere utilizzate per alimentazione animale	Nottue, Aliche ( <i>C. tibialis</i> )	50 ml/hL (500 ml/ha)  max 1 intervento/anno	21 gg

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
CIPOLLA, AGLIO	Nottue, Mosche ( <i>D. platura</i> , <i>S. univittata</i> ), Tripidi	50 ml/hl (500 ml/ha) max 2 interventi/anno	14 gg
FAGIOLINO	Nottue, Miridi ( <i>Calocoris spp.</i> , <i>Lygus spp.</i> ), Tripidi, Piralide ( <i>O. nubilalis</i> )	50 ml/hl (500 ml/ha) max 1 pre-fioritura max 1 post-fioritura	7 gg
PATATA	Tignola ( <i>P. operculella</i> ), Nottue, Miridi ( <i>Calocoris spp.</i> , <i>Lygus spp.</i> )	50 ml/hl (500 ml/ha) max 1 intervento/anno	7 gg
MAIS	Nottue, Piralide ( <i>O. nubilalis</i> )	50 ml/hl (500 ml/ha) max 1 intervento/anno	48 gg
CAVOLI A TESTA (eccetto Cavoletti di Bruxelles)	Nottue ed altri lepidotteri ( <i>P. brassicae</i> , <i>M. brassicae</i> , ecc), Cimici ( <i>Eurydema spp.</i> , <i>N. viridula</i> ), Altiche ( <i>Phyllotreta spp.</i> ), Cicaline	50 ml/hl (500 ml/ha) max 2 interventi/anno	7 gg
PISTACCHIO	Cimici, Miridi, Tignola ( <i>T. decorella</i> )	50 ml/hl (500 - 750 ml/ha) max 2 interventi/anno	7 gg
COLTURE PORTASEME	Nottue ed altri lepidotteri, Miridi, Tripidi, Cimici, Psillidi, Metcalfa, Cicaline	50 ml/hl (500 - 750 ml/ha)	-
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI E FORESTALI	Nottue ed altri lepidotteri, Miridi, Tripidi, Cimici, Psillidi, Metcalfa, Cicaline	50 ml/hl (500 - 750 ml/ha) max 3 interventi/anno	-

TREBON® UP