

Piretro ActiGreen



- › Insetticida a base di piretro naturale attivo per contatto
- › Rapida azione contro i parassiti di orticole, frutticole e floricole

COMPOSIZIONE

piretrine 2 % (18,61 g/l)

FORMULAZIONE

concentrato emulsionabile (EC)

CODICE IRAC

3A

REG. MIN. SALUTE

n° 14154 del 02.04.2008

BUFFER ZONE

Consultare l'etichetta

INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: H410; EUH401



Attenzione



SETTORI DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dose	Phi	Max
Agrumi (arancio, pompelmo, limone, mandarino, clementino)	Afidi, Mosca Bianca (Aleurodidi)	160 ml/hl (2,4 l/ha)	1 gg	3 (7 gg)
Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo)	Afidi (<i>Aphis pomi</i>), Psilla (<i>Cacopsilla</i> spp.), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	160 ml/hl (2,4 l/ha)	1 gg	3 (7 gg)
Drupacee (pesche, prugne, ciliegie, albicocche)	Afidi (<i>Myzus persicae</i>), <i>Drosophila suzukii</i> , Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	160 ml/hl (2,4 l/ha)	1 gg	3 (7 gg)
Frutta a guscio	Afidi, Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	160 ml/hl (2,4 l/ha)	1 gg	3 (7 gg)
Nocciolo	Gonocero del nocciolo (<i>Gonocerus acuteangulatus</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>), Afidi	160 ml/hl (2,4 l/ha)	1 gg	3 (7 gg)
Kiwi	Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	160 ml/hl (2,4 l/ha)	2 gg	3 (7 gg)
Olivo	Mosca dell'olivo (<i>Dacus oleae</i>), Sputacchina (<i>Philaenus spumarius</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	160 ml/hl (2,4 l/ha)	1 gg	3 (7 gg)
Vite* (Uva da vino e uva da tavola)	Tignola (<i>Clysia ambiguella</i>), Tignoletta (<i>Lobesia botrana</i>), Cicaline (<i>Scaphoideus titanus</i> , <i>Empoasca vitis</i>), Moscerino della frutta (<i>Drosophila suzukii</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	160 ml/hl (2,4 l/ha)	1 gg	3 (7 gg)
Fragola (pieno campo e serra)	Tripidi <i>Drosophila suzukii</i>	160 ml/hl (1,6 l/ha)	2 gg	3 (7 gg)
Piccoli frutti (lampone, mirtillo, mora, ribes in pieno campo e serra)	Tripidi <i>Drosophila suzukii</i>	160 ml/hl (1,28 l/ha)	2 gg	3 (7 gg)
Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili** (pieno campo e serra)	Afidi	160 ml/hl (1,28 l/ha)	1 gg	3 (7 gg)
Patata	Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	160 ml/hl (0,96 l/ha)	0 gg	3 (7 gg)

Coltura	Avversità	Dose	Phi	Max
Pomodoro, peperone, melanzana (pieno campo e serra)	Mosca Bianca (Aleurodidi), Tripidi	160 ml/hl (1,92 l/ha)	1 gg	3 (7 gg)
Cucurbitacee (melone, anguria, zucca, cetriolo, cetriolino, zucchini in pieno campo e serra)	Afidi	160 ml/hl (1,28 l/ha)	1 gg	3 (7 gg)
Cereali (grano tenero e duro, orzo, miglio, avena, segale, triticale, farro)	Afidi	160 ml/hl (0,96 l/ha)	1 gg	3 (7 gg)
Erba medica	Afidi	160 ml/hl (0,96 l/ha)	1 gg	3 (7 gg)
Floreali e ornamentali (pieno campo e serra)	Afidi, Tripidi, Mosca bianca (Aleurodidi)	160 ml/hl (1,6 l/ha)	n.r.	2 (7 gg)
Forestali	Tingidi	160 ml/hl (2,4 l/ha)	n.r.	3 (7 gg)
Verde urbano: alberature	Afidi, tripidi, mosca bianca, tingidi, cimici	160 ml/hl (2,4 l/ha)	n.r.	3 (7 gg)
Verde urbano: floreali e ornamentali	Afidi, tripidi, mosca bianca, tingidi, cimici	160 ml/hl (1,6 l/ha)	n.r.	3 (7 gg)
Verde urbano: prati e parchi	Afidi, tripidi, mosca bianca, tingidi, cimici	160 ml/hl (0,96 l/ha)	n.r.	3 (7 gg)
Cereali immagazzinati (frumento, riso, mais, orzo, avena, sorgo, segale, miglio, grano saraceno, ecc.)	Coleotteri (<i>Tribolium</i> spp., <i>Tenebroides</i> spp., <i>Trogoderma</i> spp., <i>Sitophilus</i> spp., <i>Oryzaephilus</i> spp., <i>Rhizopertha dominica</i> , <i>Cryptolestes ferrugineus</i> , etc.) Lepidotteri (<i>Plodia interpunctella</i> , <i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Ephestia elutella</i> , <i>Sitotroga cerealella</i> , <i>Tinea granella</i> , etc.)	50-67 ml/1000 kg di granella Fino a 830 ml acqua/1000 kg di granella (1 l di soluzione diluita al 6-8% ogni 1200 kg di granella)	0***	1 (per ogni lotto di cereali)
Magazzini vuoti e silos per cereali		10-12 ml di soluzione diluita al 6-8% per m ² di superficie	-	1 (prima di riempire il magazzino o il silo)

*In caso di presenza di Flavescenza dorata, valutare se ripetere il trattamento in funzione del monitoraggio di *Scaphoideus titanus*.

**Lattughe e insalate (Dolcetta/valerianella/gallinella, Lattughe, Scarola/indivia a foglie larghe, Crescione e altri germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape juncea, Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), Foglie di spinaci e simili (Spinaci, Portulaca/porcellana, Bietole da foglia e da costa), Foglie di vite e specie simili, Crescione acquatico, Cicoria Witloof/cicoria belga, Erbe fresche e fiori commestibili (Cervoglio, Erba cipollina, Foglie di sedano, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico e fiori commestibili, Foglie di alloro/lauro, Dragoncello, Altri)

***Intervallo tra il trattamento e l'uso/consumo del cereale trattato.



FLACONE
11 (cartone 12 pz)

AVVERTENZE

Effettuare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la bagnatura della pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi (*Corythucha ciliata*). Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Eliminare le infestanti prima della fioritura.